

دستور نحوه جمع آوری نمونه و شرایط قبل از آزمایش خون مخفی در مدفوع

گاهی اوقات خونریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق میفتد که به علت مقدار کم با چشم قابل دیدن نیست.

بنابراین باید با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود. بهتر است این آزمایش در ۳ نوبت انجام شود.

برای انجام این آزمایش باید نکات زیر را رعایت نمائید:

۱) ۴۸-۷۲ ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماکیان)، ماهی، شلغم و تربچه، موز، قارچ، انواع کلم، سیب، پرتقال، طالبی و انگور خودداری نمائید.

۲) منع مصرف داروهای زیر تا ۴۸ ساعت قبل از آزمایش خون مخفی در مدفوع:

آهن، ایندومتاسین، کلشی سین، آسپرین، بروفن، کورتون ها و ویتامین C باید ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش و در طول دوره جمع آوری نمونه قطع شود.

۳) در صورت خونریزی از لثه در حین تمیز کردن دهان و دندان در طی ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمائید.

۴) نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحویل داده شود. (کمتر از ۱ ساعت)

۵) نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.

واحد روابط عمومی و علمی آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین